

SOLUCIÓ EVACUANT PER A COLONOSCÒPIES PLEINVUE®

PROVA MATÍ

La caixa de Pleinvue® conté **3 sobres**:



El sobre DOSI 1
correspon a la
DOSI 1



Els sobres A i B junts
corresponen a la
DOSI 2

On recollir el Pleinvue®

Si la prova l'ha programat el **metge o la metgessa del CAP**, l'has de **recollir al CAP**.

Si la prova l'ha programat un **especialista de l'hospital**, l'has de **recollir a l'hospital**.

(Edifici Taulí, planta baixa, al taulell d'informació, de 8 a 20h, de dilluns a divendres, no cal agafar tiquet)


Quan prendre les dosis

En el cas de tenir la prova al **MATÍ** (de 8:00 a 15:00h)

- La **DOSI 1** es prendrà a les 20 o 21h el dia abans.
- La **DOSI 2** es prendrà 4 hores abans de la prova.
- **No beure res 2 hores abans** de la prova.

Per exemple, si la prova és a les **12:00h**:

- **DOSI 1**: a les **20:00 o 21:00h del dia abans**.
- **DOSI 2**: a les **8:00h del dia de la prova**.
- **No beure res a partir de les 10:00h**.



Com prendre les dosis



És important seguir aquestes pautes per evitar nàusees i vòmits

DOSI 1 A LES 20-21H EL DIA ABANS



1. Dissoldre el sobre de la DOSI 1 en **500 ml** (mig litre) d'**aigua freda**.



2. Prendre **un got** de la dosi **cada 15 minuts**, fins que s'acabi.

3. Quan s'acabi, esperar **10 minuts** i beure **500 ml d'aigua normal o de líquids clars**.

DOSI 2 4 HORES ABANS



1. Dissoldre els sobres A i B de la DOSI 2 en **500 ml** (mig litre) d'**aigua freda** i repartir en **4 gots**.

2. Repartir **500 ml d'aigua normal** en **4 gots** més.



3. Lentament, prendre **1 got cada 15 minuts**, **alternant dosi i aigua**, fins acabar els 8 gots.

